

## BEBELAC FL

**Dijetetski proizvod** - Hrana za posebne medicinske namene

Za novorođenčad i odojčad sa intolerancijom na laktozu - Od rođenja nadalje

Tokom prvih nekoliko meseci života, vaša beba se oslanja na mleko za sve hranjive materije potrebne za rast i razvoj. Međutim, neke bebe mogu patiti od dijareje usled nepodnošenja laktoze. Dobro je znati da je **Bebelac FL** formula za odojčad koja ne sadrži laktozu i osigurava da vaša beba dobije hranjive materije potrebne od rođenja, istovremeno pružajući podršku Vašoj bebi koja pati od dijareje.

Ne sadrži laktozu\*\*\* - Ne sadrži gluten - PreciNutri je nutritivno kompletan proizvod - Sadrži DHA\*\*

\*\*\*kao što se zahteva po zakonu za sve formule za odojčad

\*\*\*\*Bebelac FL nije pogodna formula za odojčad sa galaktozemijskom ili alergijom na protein kravljeg mleka.

**VAŽNA NAPOMENA: DOJENJE JE NAJBOLJE ZA VAŠU BEBU** - Proizvod nije za parenteralnu upotrebu. Koristiti pod medicinskim nadzorom. Ako se hrani na bočicu, vaša beba možda neće hteti da nastavi dojenje. Radi zdravlja vaše bebe, pažljivo sledite uputstva za pripremu. Nikada ne ostavljajte vašu bebu samu tokom hranjenja. Nepravilna upotreba ili priprema može da ošteti zdravlje vaše bebe. Od 6 meseci starosti bebe, ako to savetuje lekar ili medicinska sestra, postepeno dodavati komplementarnu hranu. **UPUTSTVO ZA PRIPREMU: Radi zdravlja vašeg odojčeta uvek se pažljivo pridržavajte uputstva. Nepravilno korišćenje ili priprema bi mogli oštetiti zdravlje vaše bebe.** 1. Uvek operite ruke i sve što se koristi za pripremu hrane. 2. Sterilizite bočicu i cuclu 10 minuta u ključaloj vodi. 3. Prokuvajete čistu vodu za piće 10 minuta; ostavite da se ohladi. Pogledajte vodič za ishranu; sipajte odgovarajuću količinu prethodno prokuvane mlake vode u sterilisanu bočicu. 4. Dodajte tačan broj ravnih merica Bebelac FL praha. Poravnajte svaku mericu tupom stranom čistog noža. Nemojte pritisnuti prah. 5. Zatvorite bočicu i dobro je promućkajte dok se sav prah potpuno ne rastvori. Stavite sterilisanu cuclu na bočicu. Proverite temperaturu hrane na unutrašnjoj strani zgloba ruke. Upotrebite je odmah nakon pripreme. 6. Operite bočicu i cuclu odmah nakon korišćenja. Neiskorišćenu hranu nikada nemojte koristiti ponovo. Čuvajte u dobro zatvorenoj konzervi na hladnom, suvom mestu, ne u frižideru. Upotrebite u roku od tri nedelje nakon otvaranja. Obavezno operite zube detetu posle večernjeg obroka.

### VODIČ ZA ISHRANU: OD 0-12 MESECI (UKOLIKO VAŠ LEKAR NE ODREDI DRUGAČIJE)

Uzrast odojčeta	Približna težina (kg)	Broj obroka tokom 24 sata	Voda (ml)	Broj ravnih merica
0 - 14 dana	2,5 - 3	7	60	2
2 - 8. nedelja	3 - 3,5	6	90	3
2 meseca	3,5 - 4	5	120	4
3 meseca	4 - 5	5	150	5
4 meseca	5 - 6	5	180	6
5 meseci	6 - 7	5	210	7
Preko 6 meseci	>7	4	210	7

Ovaj vodič za ishranu je samo uopšten vodič; vašoj bebi može biti potrebno više ili manje nego što je prikazano. **Standardna doza:** 100 ml Bebelac FL = 90 ml vode + 3 ravne merice = 276 kJ (66 kcal), 1 ravna merica = 4,4 g. Koristite isključivo priloženu mericu. Ne pravite jaču niti slabiju formulu nego što je navedeno.

**SASTOJCI:** Glukozi sirup, biljna ulja (palmino ulje, kokosovo ulje, ulje uljane repice, visoko oleinsko suncokretovo ulje, suncokretovo ulje), kalcijum-kazeinat (iz kravljeg mleka), maltodekstrin, kalcijum-fosfat, natrijum-citrat, dikalcijum-hidrogenfosfat, riblje ulje, kalijum-citrat, magnezijum-hlorid, kalijum-hlorid, L-cistein, holin-hlorid, ulje iz *Mortierella Alpina*, lecitin **soje** (emulgator), L-askorbinska kiselina, kalijum-hidroksid, inozitol, taurin, L-triptofan, L-karnitin, gvožđe(II)-sulfat, cink-sulfat, uridin-5'-monofosfat natrijumova so, citidin-5'-monofosfat, DL- $\alpha$ -tokoferil-acetat, kalcijum-D-pantotemat, adenozin-5'-monofosfat, inozin-5'-monofosfat natrijumova so, nikotinamid, guanozin-5'-monofosfat natrijumova so, bakar (II)-sulfat, riboflavin, DL- $\alpha$ -tokoferol, retinilpalmitat, tiamin-hidrochlorid, piridoksin-hidrochlorid, kalijum-jodid, pteroilmonoglutaminska kiselina, mangan-sulfat, natrijum-selenit, fitomenadion, D-biotin, holekalciferol, cijanokobolamin. **Alergeni:** mleko, riba i soja. **Neto količina:** 400g **Pakovano u zaštitnoj atmosferi. Broj serije i najbolje upotrebiti do:** ođštampano na dnu konzerve **Proizvođač:** Nutricia Cuijk B.V., Schuttersweg 12, 5443 PR Haps, Holandija **Uvezeno iz:** Holandije **Uvoznik:** KIBID d.o.o., Autoput za Novi Sad 152, 11080 Beograd, Srbija, www.kibid.rs, tel. +381 11 2198235 **Broj i datum upisa u bazu podataka Ministarstva zdravlja RS:** 550/2021 od 03.08.2021.

Prosečni sastav	Jedinice	100ml*			
<b>Energetska vrednost</b>		276/66			
<b>Masti</b> od čega:	g	3,4			
zasićene	g	1,5			
mononezasićene	g	1,3			
polinezasićene	g	0,60			
-linolna kiselina (LA)	mg	448			
- $\alpha$ -linolna kiselina (ALA)	mg	55			
-araidonska kiselina (AA)	mg	17			
-dokozahexaenska kiselina (DHA)	mg	17			
<b>Ugljeni hidrati</b> od čega:	g	7,6			
šećeri	g	1,2			
-laktoza	g	<0,007			
-inozitol	mg	7,3			
<b>Vlakna</b>	g	0			
<b>Proteini</b>	g	1,3			
kazein	g	1,3			
<b>Vitaminski sastav</b>					
<b>Vitamin A</b>	$\mu$ g	58	Natrijum	mg	22
<b>Vitamin D</b>	$\mu$ g	1,4	Kalijum	mg	80
<b>Vitamin E</b>	mg TE	1,2	Hloridi	mg	51
<b>Vitamin K</b>	$\mu$ g	4,4	Kalcijum	mg	68
<b>Vitamin C</b>	mg	9,3	Fosfor	mg	49
<b>Tiamin (B1)</b>	mg	0,07	Magnezijum	mg	5,6
<b>Riboflavin (B2)</b>	mg	0,14	Gvožđe	mg	0,71
<b>Niacin (B3)</b>	mg	0,43	Cink	mg	0,48
<b>Vitamin B6</b>	mg	0,05	Bakar	mg	0,05
<b>Folati</b>	$\mu$ g	14	Mangan	mg	0,01
<b>Vitamin B12</b>	$\mu$ g	0,17	Fluoridi	mg	$\leq 0,008$
<b>Biotin</b>	$\mu$ g	1,6	Selenijum	$\mu$ g	3,0
<b>Pantotenska kiselina</b>	mg	0,53	Jod	$\mu$ g	13
<b>Ostali nutrijensi</b>			<b>Jedinice</b>		<b>100ml*</b>
L-karnitin	mg	2,1			
Holin	mg	22			
Taurin	mg	5,4			
Nukleotidi	mg	2,3			
Osmolarnost	mOsmol/l	170			

\*100 ml = 90 ml vode + 3 ravne merice (13,2 g)