

Bebelac® 2, 400 g, prelazno mleko za odojčad

400 g pršće

Dijjetetski proizvod – prelazno mleko za odojčad od 6-12 meseci**Bebelac® 2, 400 g, prelazno mleko za odojčad je namenjeno za decu uzrasta od 6-12 meseci.****VAŽNE NAPOMENE: DOJENJE JE NAJBOLJE ZA VAŠU BEBU**

Bebelac® 2 se može koristiti samo za osnovnu savetu zdravstvenih radnika koji su kvalifikovani da se brinu o zdravlju odojčeta i koji su nezavisni od proizvođača hrane za odojčad i malu decu, i ne treba da se koristi kao zamena za majčino mleko tokom prvih 6 meseci života. Dojenje treba nastaviti i posle navršenih 6 meseci, do kraja druge godine starosti deteta. Uvođenje pojedinih namirnica u ishranu odojčeta starijeg od 6 meseci treba da preporuči zdravstveni radnik koji je kvalifikovan da se brine o zdravlju odojčeta i malog deteta i koji je nezavisan od proizvođača hrane za odojčad i malu decu.

Ukoliko se hrani na boćicu, Vaša beba možda neće hteti da nastavi sa dojenjem. Ne ostavljajte Vašu bebu nikada samu za vreme hranevanja. **Bebelac® 2** treba davati kao deo zdrave i jednačene ishrane.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU: Zbog zdravlja Vaše bebe, uvek se pažljivo pridržavajte uputstva. Nepravilna upotreba ili priprema mogu narušiti zdravlju Vaše bebe.

1. Uvek operite ruke, koristite čist ili sterilisan pribor i uverite se da je gornja površina pakovanja čista.

2. Sterilisite sav pribor u ključalači vodi 10 minuta. 3. Prokuvaljte čistu vodu za pice 10 minuta i sačekajte da se pruhlači. Pogledajte uputstvo za pripremu obroka. Sipajte tačnu količinu prethodno prokuvane mlijeko vode u sterilisanu flašicu. 4. Dodajte tačan broj ravnih merica praha **Bebelac® 2**. Poravnajte svaku mericu zadnjim stranom čistog noža. Ne utiskujte prah. Koristite samo priloženu mericu. 5. Zatvorite flašicu i drobno je protrešite dok se prah sasvim ne rastvori. Slavite sterilisanu cuđulu na flašicu. Proverite temperaturu obroka na unutrašnjoj strani zgloba Vaše šake (nadlanica). Pripremite obrok za upotrebu i iskoristite u roku od 2 sata. 6. Operite flašicu i cuđulu odmah nakon upotrebe. Uvek odbacite neupotrebljeni obrok.

UPUTSTVO ZA PRIPREMU:

Uzrast	Težina deteta (kg)	Broj obroka (na 24 sata)	Voda (ml)	Broj ravnih merica
6-12 meseci	6-11	3	180	6
Prekro 12 meseci	> 10	2	210	7

Ovaj vodič ishrane samo je opšti vodič. Vašoj bebi može biti potrebno više ili manje nego što je prikazano.

Standardno doziranje: za 100 ml **Bebelac® 2** = 90 ml vode (oko 40 °C) + 3 ravne merice = 286 kJ (68 kcal). 1 ravna merica = 4,7 g.

Koristite samo priloženu mericu.

Ne pravite formulu jače ili slabije nego što je naznačeno.

Nutritivne informacije (prosečan sastav):	100,0 ml* obroka
Energetska vrednost (kJ / kcal)	285 / 68
Masti – ukupno (g)	3,2
od kojih zasićene masne kiseline (g)	1,0
od kojih mononezasićene masne kiseline (g)	1,6
od kojih polinezasićene masne kiseline (g)	0,5
-linolska kiselina (LA) (mg)	498
-arachidonska kiselina (AA) (mg)	52,5
-dokozaheksanska kiselina (DHA) (mg)	1,2
Ugrijeni hidrat – ukupno (g)	17
od kojih šećeri (g)	8,3
poljohranjivi šećeri (g)	8,2
od kojih poljoli i inositol (g)	0,1
Vlakna (g)	0,3
od kojih GOSE™ (g)	0,24
od kojih FOS™ (g)	0,04
Protein (g)	1,4
-protein surutke (g)	0,5
Sok (g)	0,8
	0,06

* 100 ml = 90 ml vode (na oko 40 °C) + 3 ravne merice (14,1 g)

** galakto-oligosahardi

*** frukto-oligosahardi

Nutritivne informacije (prosečan sastav):	100,0 ml* obroka
Sadržaj aktivnih komponenti	100,0 ml obroka
Vitamini	
Vitamin A	60,0 µg RE
Vitamin D3	1,7 µg
Vitamin E	1,33 mg α-TE
Vitamin K	4,3 µg
Vitamin C	5,5 mg
Vitamin B1 (tiamin)	0,11 mg
Vitamin B2 (riboflavin)	0,14 mg
Vitamin B3 (niacin)	0,46 mg NE
Vitamin B5 (panotenska kiselina)	0,52 mg
Vitamin B6 (piridoksinska kiselina)	0,09 mg
Vitamin B7 (biotin)	2,0 µg
Vitamin B12 (cobalamin)	0,19 µg
Minerali	
Natrijum	23,0 mg
Kalijum	72,0 mg
Hidrili	52,0 mg
Željezo	0,9 mg
Magnijum	5,0 mg
Gvožđe	6,8 mg
Cink	1,0 mg
Baker	0,05 mg
Mangan	0,005 mg
Florofenol	< 0,005 mg
Selen	3,1 µg
Jod	13,0 µg
Ostalo	
L-karnitin	2,0 mg
Holin	17,0 mg
Ugrijeni hidrati niske kalorijske vrednosti	0,1 g

BEB2400G1024S