

MONOGEN

Dijetetski proizvod - hrana za posebne medicinske namene
 Hrana za specijalne medicinske namene. Za dijetetski režim ishrane kod poremećaja koji zahtevaju nizak unos triglicerida dugih lanaca (LCT), a visok unos triglicerida srednjeg lanca (MCT), kao što su defekti oksidacije masnih kiselina dugog lanca (LCHADs), hiltoraks i limfangiektazija. Nutritivno kompletna hrana sa niskim sadržajem masti, kompletnim proteinima surutke u prahu, sa niskim sadržajem triglicerida dugog lanca (LCT) i visokim sadržajem triglicerida srednjeg lanca (MCT).

VAŽNA NAPOMENA: Samo za enteralnu primenu. Nije za parenteralnu primenu. Mora da se koristi pod medicinskim nadzorom. Pogodno kao jedini izvor ishrane kod odojčadi i kao dodatna hrana za decu preko 1 godine i za odrasle. **Alergeni: Sadrži mleko i orahovo ulje.**

Preporučeni unos: Količinu hrane i razredjenje treba da odredi isključivo kliničar ili dijetetičar, a to zavisi od starosti, telesne mase i medicinskog stanja pacijenta.

Preporučena koncentracija hrane: Za svaku ravnu mericu (5,6 g) potrebno je 30 ml vode da se postigne preporučena koncentracija (16,8% w/v). Osmolalnost pri ovoj koncentraciji je 240 mOsmol/kg H₂O.

Priprema: ZDRAVLJE VAŠEG DETETA ZAVISI OD PAŽLJIVOG PRIDRŽAVANJA UPUTSTAVA ZA PRIPREMU I PRIMENU. USLED NEPRAVILNE PRIPREME SE VAŠA BEBA MOŽE RAZBOLETI.

1. Dobro oprati ruke i mesto pripreme. Sterilizirati bočicu i cude. 2. Prokuvati svežu vodu 5 minuta ili dok se električni keuter ne isključi. Ostaviti da se ohladi najmanje 30 minuta tako da je topla na unutrašnjoj strani ručnog zgloba. Sipati potrebnu količinu vode u sterilisanu bočicu. 3. Napuniti priloženu mericu praškom i zaravniti je čistim, suvim nožem. Ne utiskivati prašak u mericu. Koristiti isključivo priloženu mericu. 4. Dodati propisan broj merica praška u vodu. Vratiti poklopac na bočicu i protresti dok se prašak ne rastvori. Pre hranjenja proveriti da formula ima odgovarajuću temperaturu stavljanjem par kapi na unutrašnju stranu ručnog zgloba. 5. Upotrebiti odmah posle rekonstitucije. Formulu koja preostane u bočici nakon jednog sata hranjenja treba baciti. Formula se ne sme ponovo zagrevati tokom hranjenja.



Važno: Formula za odojčad u prahu nije sterilna. Formulu za odojčad treba pripremati neposredno pre hranjenja. Formulu ne kuvati i ne koristiti mikrotalasnu pećnicu za zagrevanje.

Upozorenje na dentalnu higijenu: Dobra dentalna higijena je važna za odojčad i decu, jer produženi kontakt tečnosti i hrane povećava rizik od kvara zuba. Osigurajte da su njihovi zubi oprani posle poslednjeg večernjeg obroka. Za savet pitajte Vašeg lekara ili stomatologa.

Čuvanje: Čuvati na hladnom, suvom mestu. Posle upotrebe uvek vratite poklopac. Jednom kada se konzerva otvori, upotrebiti u roku od 1 meseca. Pakovano u zaštićenoj atmosferi.

SASTOJCI: Maltodekstrin, obrano kraljevo mleko, prečišćena biljna ulja (trigliceridi srednjeg lanca (kokosovo i/ili palmino ulje), orahovo ulje, sunčokretovo ulje), protein surutke (iz kraljevog mleka), kalcijum-kazeinat (iz kraljevog mleka), natrijum-citrat, glukozni sirup, kalijum-hlorid, kalcijum-karbonat, magnezijum-hidrogenfosfat, ulje iz *Cryptocodium cohni*, hlin-hlorid, ulje iz *Mortierella alpina* L-valin, inozitol, L-askorbinska kiselina, L-triptofan, natrijum-L-askorbat, taurin, gvožđe(II)-sulfat, cink-sulfat, L-karnitin, DL-α-tokoferol acetat, nikotinamid, DL-α-tokoferol, kalcijum-D-pantotemat, bakar(II)-sulfat, piridoksin-hidrohlorid, retinilacetat, tiamin-hidrohlorid, riboflavin, pteroilmonoglutaminska kiselina, kalijum-jodid, mangan(II)-sulfat, hrom(III)-hlorid, natrijum-molibdat, fitomenadion, D-biotin, natrijum-selenit, holekalciferol. **Alergeni: sadrži mleko, orahovo ulje.**

Serija: Videti na dnu limenke. **Neto količina:** 400 g **Najbolje upotrebiti do:** Videti na dnu limenke.

Proizvođač: Milupa GmbH, Schleyerstrasse 4, 36041 Fulda, Nemačka **Izvoznik:** N.V Nutricia, Eerste Stationstraat 186, Zoetermeer, Holandija.

Uvezeno iz: Holandija **Uvoznik:** KIBID d.o.o., Autoput za Novi Sad 152, 11080 Beograd-Zemun, Srbija, tel. +381 11 2198235, www.kibid.rs, e-mail: info@kibid.rs. **Broj i datum upisa u bazu podataka Ministarstva zdravlja RS:** 7767/2020 od 06.11.2020.

NUTRITIVNE INFORMACIJE	na 100 g	na 100 ml*
Energetska vrednost	1859 kJ/441 kcal	312 kJ/74 kcal
Masti	12,9 g	2,2 g
-Zasićene	11,3 g	1,9 g
-Mononezasićene	0,34 g	0,06 g
-Polinezasićene	1,3 g	0,22 g
-Linolna kiselina (LA)	0,87 g	0,146 mg
-α-linolna kiselina (ALA)	0,17 g	29,4 mg
-Dokosaheksaenska kiselina (DHA)	0,06 g	10,4 mg
-Arahidonska kiselina (AA)	0,06 g	10,4 mg
MCT/TCM	10,9 g	1,8 g
MCT%/TCM%	84 (g/100g masnih kiselina)	
LCT/TCL	2,0 g	0,34 g
LCT%/TCL%	16 (g/100g masnih kiselina)	
Odnos Omega-6:Omega-3 masnih kiselina	3,87:1	
Ugljeni hidrati	68,6 g	11,5 g
-Šećeri	11,3 g	2,0 g
Vlakna	0 g	0 g
Proteini	12,8 g	2,2 g
So	0,52 g	0,09 g

MINERALI I ELEMENTI U TRAGOVIMA		VITAMINI	
Na 100 g	U 100 ml*	Na 100 g	Na 100 ml*
Na (9,13 mmol)	1,53 mmol	Vit. A	386 µg
210 mg	35,3 mg	Vit. D	11,9 µg
K (10,2 mmol)	1,71 mmol	Vit. E	(4,92 mg TE/ET**)
397 mg	66,7 mg		TE/ET**
Cl (8,49 mmol)	(1,43 mmol)		6,64 mg
301 mg	50,6 mg	Vit. C	59,9 mg
Ca (9,12 mmol)	(1,53 mmol)	Vit. K	17,9 µg
365 mg	61,4 mg	Tiamin	0,36 mg
P (7,09 mmol)	(1,19 mmol)	Riboflavin	0,52 mg
1220 mg	199,9 mg	Niacin	(7,47 mg NE/EN***)
Mg (1,81 mmol)	(0,30 mmol)		3,00 mg
44,0 mg	7,39 mg		0,50 mg
Fe 6,63 mg	1,11 mg	Vit. B6	0,44 mg
Cu 0,36 mg	0,060 mg	Folna kiselina	70,2 µg
Zn 4,56 mg	0,77 mg		11,8 µg
Mn 0,031 mg	0,005 mg	Folati	117 µg
I 86,5 µg	14,9 µg	Vit. B	0,83 µg
Mo 24,0 µg	4,03 µg	Biotin	15,5 µg
Se 17,4 µg	2,92 µg	Pantotenska kiselina	2,21 mg
Cr 9,93 µg	1,67 µg		0,37 mg

*Preporučeno razblaženje = 16,8 g praška + 90 ml vode.
 **Tokoferol ekvivalenti
 ***Niacin ekvivalenti

OSTALO:	
Holin	101 mg
Inozitol	87,4 mg
L-karnitin	10,7 mg
Taurin	29,9 mg
Osmolalitet	240mOsmol/kg H ₂ O